


Bonnes pratiques d'utilisation des variétés de betterave CONVISO® SMART

Note validée AIBS – septembre 2022

Schéma général d'utilisation de la technique de désherbage CONVISO® ONE



Semis :

- Le produit CONVISO® ONE (foramsulfuron 50 g/l + thiencarbazon méthyl 30 g/l) ne doit être utilisé qu'avec des variétés de betteraves CONVISO® SMART.
- Les semences CONVISO® SMART ne doivent pas être mélangées avec des semences classiques.
- La vidange des trémies du semoir doit être effectuée avant et après l'introduction des semences CONVISO® SMART (pas de mélanges).
- En cas des semis de variétés CONVISO® SMART et autres variétés ; Il est conseillé de commencer les semis pas les variétés CONVISO® SMART.
- Ne pas utiliser de variété CONVISO®SMART si des adventices présentes dans la parcelle ont des résistances avérées aux herbicides du groupe HRAC 2 (B).

Désherbage :

- Utiliser de façon systématique, pour chaque passage, en mélange avec l'herbicide CONVISO® ONE, une ou plusieurs matières actives disposant d'un autre mode d'action HRAC (phenmédiaphame, éthofumésate, métamitronne, clomazone, lénacile ..., à adapter en fonction de la flore présente), conformément au conseil qui sera donné.
- Un volume d'huile est ajouté en complément (entre 0.5 et 1 l/ha).
- Le premier traitement doit être effectué au stade 2 feuilles vraies des premiers chénopodes. Attendre au minimum 10 à 14 jours pour la deuxième application et le stade 2 feuilles vraies des nouveaux chénopodes ou autres adventices.
- Si des variétés classiques et CONVISO® ONE sont dans des parcelles adjacentes, traiter une bande de CONVISO® SMART avec les produits classiques. Attention aux dérives de brouillard sur les semences traditionnelles, le produit est très volatil.
- En cas de sécheresse ou de pression exceptionnelle d'adventices, un 3^{ième} désherbage peut être effectué sans utiliser le CONVISO® ONE (2 passages de ce produit maximum sont autorisés).
- Respecter les conseils de base d'un désherbage : absence de vent, hygrométrie suffisante ...
- Maintenir les programmes antigaminées et anti-chardons si nécessaire.
- CONVISO® ONE est une sulfonylurée, le nettoyage de tous les organes du pulvérisateur est nécessaire après le traitement. Il est recommandé de traiter les variétés classiques en premier.
- Retirer les montées à graines de l'année au plus tôt et avant maturité et les sortir de la parcelle.

Dans la rotation

- Pour le choix des cultures suivantes, tenir compte de l'étiquette du produit CONVISO® ONE
- Détruire les repousses de betteraves dans les cultures suivantes (et sur les andains de déterrage) avant qu'elles ne montent en graines par une molécule d'une autre famille que celle des sulfonylurées.
- Diversifier les modes d'action herbicides dans la rotation, en particulier limiter l'application en solo d'herbicides de la famille des sulfonylurées